

Solu-Cortef®

(succinato de hidrocortisona sódica
inyectable, USP)

Act-O-Vial®



Escanee el código QR para ver las instrucciones del video para la administración del ACT-O-VIAL® o busque «Cómo usar el Sistema ACT-O-VIAL» en el canal Pfizer Ready-To-Use en YouTube.

O visite <https://www.pfi.sr/howtouse-act-o-vial-system>.

Cómo preparar y ponerse la inyección

Las siguientes instrucciones deben utilizarse como guía. Asegúrese de hablar con su profesional de la salud, ya que es la mejor fuente de información. Hable siempre con su profesional de la salud acerca de las técnicas para colocarse la inyección.



PASO 1

Lávese las manos con agua y jabón o con un desinfectante de manos a base de alcohol.

Ensamble su equipo:

- Solu-Cortef® Act-O-Vial®
- Almohadillas con alcohol o bolas de algodón y alcohol isopropílico
- Jeringa con aguja unida
- Venda adhesiva

Compruebe la fecha de vencimiento en el vial de Solu-Cortef. Si el Solu-Cortef se ha vencido, no lo use.



PASO 2

Empuje firmemente hacia abajo la parte superior del Act-O-Vial para forzar el líquido hacia la cámara inferior.



PASO 3

Suavemente mezcle la solución. Asegúrese de que la solución esté transparente antes de su uso.




PASO 4

Quite la lengüeta de plástico de la parte superior del vial que cubre el tapón de goma.



PASO 5

Limpie el tapón de goma con una almohadilla con alcohol o bola de algodón humedecida en alcohol isopropílico. Deje secar.



PASO 6

Quite la tapa de la jeringa e inserte la aguja a través de la parte media del tapón, hasta que la punta de la aguja quede visible en el Act-O-Vial.



PASO 7

Ponga de cabeza el vial. Tire del émbolo de la jeringa hacia atrás hasta que haya la cantidad correcta de Solu-Cortef en la jeringa. Saque la aguja del vial.

Cómo preparar y ponerse la inyección (cont'd)


Las siguientes instrucciones deben utilizarse como guía. Asegúrese de hablar con su profesional de la salud, ya que es la mejor fuente de información. Hable siempre con su profesional de la salud acerca de las técnicas para colocarse la inyección.



PASO 8


Si hay burbujas de aire, sujete la jeringa con la aguja apuntando hacia arriba y con sus dedos golpetee por un lado de la jeringa hasta que las burbujas suban flotando hacia la parte superior.

Suavemente empuje el émbolo hacia arriba para sacar las burbujas de aire de la jeringa. Vuelva a colocar la tapa de la aguja.




PASO 9

Escoja el sitio para inyectar, generalmente la parte externa de la parte media del muslo. Limpie el área con una almohadilla con alcohol y espere a que se seque.



PASO 10

Quite la tapa de la aguja y sostenga la jeringa como si sostuviera un dardo y a un ángulo de 90° con respecto al área donde se pondrá la inyección.



PASO 11

Use el pulgar y los 2 primeros dedos para estirar la piel y ejerza presión hacia abajo ligeramente.



PASO 12

Inserte la aguja directamente hacia abajo con un solo movimiento rápido para inyectar el muslo. Con cuidado empuje el émbolo hasta inyectar la dosis completa.



PASO 13

Después de inyectar el Solu-Cortef, coloque un pañuelito desechable, una bola de algodón o una gasa cerca de la aguja. Luego saque la aguja rápidamente. Ejerza presión en la gasa sobre el área de la inyección por unos segundos. Cubra el área de la inyección con una venda.

No vuelva a colocar la tapa de la aguja. Deseche la aguja y la jeringa en un recipiente para objetos punzocortantes.

Es muy importante que lleve consigo su medicación todo el tiempo y cuandoquiera que viaje.

Indicación

Solu-Cortef® (succinato sódico de hidrocortisona inyectable, USP) se utiliza en el tratamiento de la insuficiencia adrenocortical primaria y secundaria y la hiperplasia suprarrenal congénita (existente al nacer), las cuales causan niveles bajos de cortisol y, a veces, niveles bajos de aldosterona en el cuerpo.

Información Importante acerca de su Seguridad

El Solu-Cortef no debe administrarse a pacientes con infecciones fúngicas sistémicas o pacientes que sean alérgicos a algunos de sus ingredientes. Pueden producirse reacciones graves.

El Solu-Cortef no debe administrarse a pacientes que padezcan de púrpura trombocitopénica idiopática, condición que causa una baja en las plaquetas y puede provocar un sangrado.

El Solu-Cortef no debe inyectarse en el área de la médula espinal porque no está aprobado para este uso. Se han reportado casos graves como parálisis, apoplejía, ceguera e, incluso, hasta la muerte.

El Solu-Cortef inyectable puede causar hundimientos y hendiduras en la piel y no debe inyectarse en el músculo del hombro (deltoides).

Dígale a su médico si usted experimenta un estrés inusual, porque podría necesitarse un reajuste en la dosis del medicamento.

Dosis promedio y grandes de corticosteroides, incluyendo el Solu-Cortef, pueden causar una subida de la presión arterial o hinchazón por la retención de agua y sal. Puede producirse una pérdida mayor de potasio. Dígale a su médico si tiene problemas del corazón, los riñones, las glándulas suprarrenales o con la presión arterial antes de comenzar a tomar los medicamentos.

Los corticosteroides, incluyendo el Solu-Cortef, pueden causar problemas endocrinos tales como niveles altos de azúcar en la sangre. Su médico debe supervisarlos por estas condiciones si toma corticosteroides durante un período prolongado.

Los pacientes que toman corticosteroides, incluyendo el Solu-Cortef, son más propensos a contraer infecciones. Estas infecciones pueden ser leves, pero también pueden resultar siendo graves y, a veces, fatales. Los corticosteroides pueden enmascarar algunos signos y síntomas de infección o empeorar infecciones desconocidas.

Si tiene fiebre u otros signos de infección, debe llamar a su médico de inmediato.

Debe informar a su médico si ha visitado el trópico, si tiene diarrea o lombrices intestinales, o si alguna vez tuvo o estuvo alrededor de alguien con tuberculosis.

Dígale a su médico si está tomando algún corticosteroide antes de que le pongan cualquier vacuna o inyección.

Cuando tome Solu-Cortef, debe evitar el contacto con personas que tienen varicela o sarampión. Si cree que estuvo alrededor de alguien con estas infecciones, llame a su médico de inmediato.

El uso de corticosteroides, incluyendo el Solu-Cortef, puede causar problemas de los ojos tales como glaucoma, infecciones y cataratas.

Debe usar la dosis más baja de Solu-Cortef para tratar su problema médico. Cuando se pueda disminuir la dosis, se debe hacer lentamente. No deje de tomar el Solu-Cortef, salvo que su médico le diga que lo haga.

También debe informar a todos sus médicos que está tomando un corticosteroide.

Los corticosteroides, incluyendo el Solu-Cortef, podrían interactuar con otros medicamentos. Debe informar a su médico acerca de todos los demás medicamentos que está tomando y no debe tomar ningún medicamento sin hablar primero con su médico.

Informe a su médico si está embarazada o planea quedar embarazada. No se sabe si Solu-Cortef podría dañar a su bebé por nacer. Dígale también a su médico si está dando de lactar o planea hacerlo. El Solu-Cortef pasa a la leche y puede causar un serio problema de crecimiento u otros problemas para su bebé. Hable con su médico sobre la mejor manera de alimentar a su bebé si toma Solu-Cortef.

El Solu-Cortef puede causar problemas de fertilidad en los hombres.

Los corticosteroides, incluyendo el Solu-Cortef, también pueden causar daños en la piel, un ataque o insuficiencia cardíacos, problemas del ritmo cardíaco, ruptura de tendones, irregularidades menstruales, diabetes, pérdida ósea, fracturas y problemas en las articulaciones, depresión, cambios de humor y otros problemas de salud mental, problemas cerebrales y del sistema nervioso, disminución de los espermatozoides, aumento de peso, cansancio, debilidad muscular, hemorragia del estómago e intestinal, así como problemas de crecimiento en los niños. Llame a su médico inmediatamente si nota que tiene algún signo o síntoma adversos mientras toma corticosteroides, incluyendo el Solu-Cortef.

Remítase a la información completa acerca de la prescripción que encontrará en el folleto tamaño bolsillo.



Se aconseja reportar a la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) sobre los efectos secundarios negativos de los medicamentos recetados. Visite www.fda.gov/medwatch o llame al 1-800-FDA-1088.

PP-SLC-USA-0024 © 2024 Pfizer Inc. Todos los derechos reservados.
Mayo 2024